



AMBULANT HYSTEROSKOPI

En kikkertundersøgelse af livmoderhulen (hysteroskopi) udføres for at kunne se livmoderhulen indefra. Der kan være forskellige årsager til at udføre en kikkertundersøgelse. Man kan have mistanke om en polyp, man kan have uafklarede blødningsproblemer eller man kan have behov for mere viden om livmoderhulens anatomi ved gentagen mislykket fertilitetsbehandling. Ofte vil man tage en lille vævsprøve fra livmoderslimhinden, der analyseres for celleforandringer hos patologerne. Hos fertilitetspatienter vil vævsprøven også blive analyseret for kronisk betændelse (endometritis).



FØR UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen foretages bedst i dagene efter din menstruation, typisk cyklusdag 6-10. Det anbefales at tage

smertestillende medicin cirka en time før (Panodil 1 gram og Ibuprofen 400 mg), da nogle kan opleve sammentrækninger af livmoderen under indgrebet, der minder om menstruationssmerter.

PRAKTISK FORLØB AF UNDERSØGELSEN

Ved undersøgelsen føres en lille slank kikkert gennem livmoderhalsen og op i livmoderhulen. For at få et godt billede pumpes saltvand op i livmoderhulen, så den åbner sig. Gennem kikkerten kan man se slimhinden samt indmundingen af begge æggeledere. Hvis der er en polyp, et fibrom eller en skillevæg kan denne fjernes gennem kikkerten. I nogle tilfælde vil dette dog kræve, at der aftales en ny tid for indgrebet. En eventuel vævsprøve udhentes med en slank tang (grasper) og sendes til mikroskopi hos patologerne. Undersøgelsen foretages i lokalbedøvelse og varer typisk omkring 20 minutter. Lokalbedøvelsen lægges med en tynd nål i livmoderhalsen inden kikkerten indføres.

EFTER UNDERSØGELSEN

Det er ikke unormalt med let blødning og murren i underlivet i dagene efter indgrebet, afhængig af hvad der er foretaget. Ved behov kan smertestillende i



AMBULANT HYSTEROSKOPI

form af Panodil 1 gram og Ibuprofen 400 mg hver 6.-8. time anvendes det første døgn. Kontakt klinikken eller egen læge, hvis du får feber, stærke smerter eller meget kraftig blødning.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Efter 2-3 uger vil du få svar på den mikroskopiske undersøgelse af det væv, der er fjernet. Ved ønske herom medgives en skriftlig rapport om indgrebet.