




HSU (HYSTERO-SALPINGO-ULTRASONOGRAFI)

En hystero-salpingo-sonografi (HSU) er en ultralydsundersøgelse, der tester passagen gennem æggeledeerne. Samtidig undersøges livmoderhulen for polypper, fibromer, skillevægge eller sammenvoksninger. Undersøgelsen foretages ofte som en del af udredningsprogrammet for primær og sekundær infertilitet og bidrager med vigtig information før planlægningen af det videre forløb. En lukket æggeleder forhindrer sædcellerne i at nå ægget, hvorfor det er nødvendigt med mindst en åben æggeleder for at opnå graviditet på naturlig vis eller ved insemination. Abnormiteter i selve livmoderhulen kan nedsætte chancen for, at det befrugtede æg sætter sig fast (implantation), og man vil i nogle tilfælde vælge en operativ fjernelse før eventuel start på fertilitetsbehandling.

FØR UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen foretages bedst i dagene lige efter menstruation (cyklusdag 6-10). Det anbefales at tage Panodil 1 gram og Ipren 400 mg 1-2 timer før undersøgelsen, da nogle kvinder oplever krampelignende smerter i underlivet, særligt når den lille ballon pustes op. Ved lukkede æggeledere kan der forekomme

kraftigere smerter.



HSU PROCEDURE

Undersøgelsen varer typisk 5-10 minutter. Den foregår i gynækologisk leje, hvor et spekulum indsættes, hvorved livmoderhalsen bliver synlig. Herefter føres et tyndt bøjeligt siliconekateter forsigtigt op i livmoderhulen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at anlægge lokalbedøvelse med en lille nål for at kunne føre katetret op. Når det er på plads, oppustes en lille ballon, så det ikke glider ud. Herefter sprøjtes saltvand gennem katetret, og væskens passage gennem æggeledeerne følges på ultralydsskærmen. Efter passagetesten tømmes ballonen for luft, og livmoderhulen fyldes op med saltvand. Saltvandet bliver sort på



HSU (HYSTERO-SALPINGO-ULTRASONOGRAFI)

ultralydsskærmen, hvorved eventuelle processer i livmoderhulens slimhinde bliver meget tydelige.

EFTER UNDERSØGELSEN

Man kan tage hjem umiddelbart efter undersøgelsen og genoptage sine normale aktiviteter. Det er normalt at have let blodigt udflåd de første dage. Hvis du får feber, stærke smerter eller ildelugtende udflåd skal du kontakte klinikken eller egen læge.